

УДК 633.63.632.953

ЗАБУР'ЯНЕНІСТЬ ПОСІВІВ У СІВОЗМІНАХ ІЗ РІЗНИМ НАСИЧЕННЯМ ЦУКРОВИМИ БУРЯКАМИ

ТИЩЕНКО М.В.,

старший науковий співробітник
Веселоподільське відділення
Інституту цукрових буряків
НААНУ

Вступ. Цукрові буряки – одна з основних технічних сільськогосподарських культур в Україні та в інших країнах із помірним кліматом, є досить високопродуктивною культурою й при наявності оптимальних умов вегетації здатна синтезувати органічні речовини у великих обсягах [1].

Однією із ключових проблем, які перешкоджають отримувати вагомі врожаї всіх сільськогосподарських культур, є бур'яни [2].

Важливою ланкою сучасних інтенсивних систем адаптивно-ландшафтного землеробства повинен бути ефективний захист посівів культурних рослин від бур'янів.

Бур'яни є дестабілізуючим фактором, що не дозволяє сповна використати потенціал сільськогосподарських культур, зменшуючи їхній урожай та створюючи серйозні складнощі при збиранні й зберіганні продукції [3].

У посушливих умовах одним із головних чинників гострої конкуренції бур'янів із культурними рослинами є боротьба за обмежені запаси вологи в ґрунті. Більшість видів бур'янів мають потужну, добре розвинену кореневу систему й велике водоспоживання. Бур'яни використовують ґрутові запаси вологи в 2-4 рази інтенсивніше, ніж культурні рослини. Навіть при середньому рівні забур'янення посівів вони здатні виносити за вегетацію із ґрунту до 1000-12000 т/га продуктивної вологи. Особливо посилюється конкурентна активність бур'янів за недостатнього зволоження й високих температур повітря.

Забур'яненість посівів є основною причиною зниження врожайності цукрових буряків. У боротьбі за використання вологи, елементів живлення й сонячної енергії бур'яни більш конкурентоспроможні, ніж цукрові буряки

[4]. Бур'яни, що є постійними суперниками й конкурентами цукрових буряків за фактори життя (світло, вологу, простір, поживні речовини), нерідко негативно позначаються на врожайності культури. При недостатньо ефективному контролюванні бур'янів, зниження її продуктивності досягає 40 т/га або 79 %.

Тому спрощення технології вирощування цукрових буряків, як правило, призводить до істотного зниження продуктивності культури.

Успіх у боротьбі з бур'янами на посівах цукрових буряків забезпечує застосування раціональної системи, яка гармонійно включає агротехнічні й хімічні методи.

Однією з найбільш ефективних агротехнічних операцій, що сприяє значному підвищенню продуктивності цукрових буряків, є дотримання правильного чергування культур і науково обґрунтованих сівозмін. Тільки в сівозмінах можна виконати всю систему контролю за бур'янами.

Чергування культур із різними біологічними властивостями та потребами в зволоженні, освітленні й поживних речовинах – один із найважливіших заходів контролю бур'янів. Дієвість сівозміні не вичерpuється лише тим, що в ній здійснюється науково обґрунтоване чергування культур, комплекс заходів обробітку ґрунту, удобрення та ін., що спрямовані на поліпшення умов розвитку вирощуваних рослин і зниження бур'янів.

Мета наших досліджень – визначен-

ня впливу сівозмін із різним насиченням цукровими буряками на забур'яненість їхніх посівів.

Методика досліджень. Дослідження проводили в стаціонарному досліді Веселоподільської дослідно-селекційної станції протягом 1982-1997 років, у якому вивчали різне насичення десятипільних сівозмін цукровими буряками (від 20 до 40%). Ґрунтовий покрив поля стаціонарного досліду – чорнозем потужний малогумусний слабосолонцоватий, характерний для зони діяльності станції. Потужність гумусного горизонту коливається від 35 до 45 см із вмістом гумусу від 4,0 до 4,4%. Структура орного шару – пилувато-грудкувато-зерниста, підорного – зернисто-грудкувата, нетривка. Ґрунт дослідної ділянки містить значні запаси поживних речовин: азоту лужногідролізованого – 1,0-1,5; фосфору – 2,5-6,0; калію – 10,5-16,0 мг/100 г ґрунту. Реакція ґрунтового розчину в орному шарі слаболужна, близька до нейтральної (рН = 7,2-7,7). Агротехніка вирощування культур загальноприйнята для зони. Використовували сорт цукрових буряків Веселоподільський однонасінний 29. Площа посівної ділянки в досліді – 160 м², облікової ділянки – 100 м². Повторність – чотириразова, розміщення ділянок – систематичне. Кількісний облік бур'янів у посівах цукрових буряків проводили за методикою ВНІС у період до проведення першого міжрядного обробітку за допомогою рамок площею 0,25 м² на ділянці досліду в чотириразовому по-

Таблиця 1.
Забур'яненість посівів цукрових буряків (1983-1997 рр.)

Відсоток буряків у сівозмінах, %	Кількість бур'янів перед шаруванням, шт. на 1 м ²			
	I поле	II поле	III поле	IV поле
20	52,1	56,1	X	X
30	51,3	65,7	79,8	X
40	60,2	72,3	94,6	115,2




Рис.1 Динаміка забур'яненості посівів цукрових буряків у сівозмінах з різною їх часткою залежно від передпопередників.

вторенні. Територія станції знаходить-ся в зоні недостатнього зволоження південно-східної частини Лівобережного Лісостепу України, де середньо-багаторічні дані випадання опадів наступні: за рік – 503 мм, у тому числі з квітень-вересень – 298 мм. Найбільша кількість опадів на Веселоподільській дослідно-селекційній станції в літній період – 168 мм або 34 % річної їхньої суми, восени – 117 мм або 24 %, весною – 106 мм або 22 % і найменше опадів випадає зимою – 101 мм або 20 %.

Чергування культур у сівозмінах: при 20 % цукрових буряків – чорний пар, озима пшениця, цукрові буряки, ячмінь із підсіванням багаторічних трав, багаторічні трави, озима пшениця, цукрові буряки, ячмінь, озима пшениця, кукурудза на зерно; при 30 % – чорний пар, озима пшениця, цукрові буряки, ячмінь із підсіванням багаторічних трав, багаторічні трави, озима пшениця, цукрові буряки, ячмінь, озима пшениця, цукрові буряки; при 40 % – чорний пар, озима пшениця, цукрові буряки, ячмінь, цукрові буряки, ячмінь, цукрові буряки, ячмінь, озима пшениця, цукрові буряки.

Результати дослідження.

У 1983-1997 роках у наших дослідженнях були проведені обліки забур'яненості посівів цукрових буряків на період формування густоти рослин (таблиця 1).

Насичення сівозмін буряками до 30 і 40 % спричинило підвищення забур'яненості посівів. Так, у першому

полі нараховувалось бур'янів: при 20 % буряків – 52,1 шт./м², при 30 % буряків – 51,3 шт./м², при 40 % буряків – 60,2 шт./м². У третьому полі сівозмін з 30 і 40 % буряків нараховували відповідно 79,8 і 94,6 шт./м² бур'янів. Найбільша кількість бур'янів була в четвертому полі – 115,2 шт./м². Слід відзначити, що в сівозміні із чотирма полями буряків зростання забур'яненості посівів мало тенденцію поступового збільшення від 60,2 штук на 1 м² у першому полі до 115,2 штук на 1 м² у четвертому полі (таблиця 1).

Забур'яненість посівів цукрових буряків у середньому за 1983-1997 роки була найменшою в ланці, де передпопередником буряків був чорний пар: від 52,1 шт./м² у сівозміні з 20 % буряків до 60,2 шт./м² у сівозміні з 40 % буряків. У ланці із чорним паром

кількість бур'янів під впливом збільшення частки цукрових буряків до 40 % буряків у сівозміні зросла лише на 15,5 %. У ланці з багаторічними травами забур'яненість посівів цукрових буряків зросла порівняно з ланкою з чорним паром і становила 56,1 і 65,7 шт./м² відповідно у сівозмінах з 20 і 30 % буряків. Сам фактор чорного пару сприяв зменшенню забур'яненості на 7,6 % при 20 % насиченні сівозміни цукровими буряками і на 28,1 % при 30 % буряків у сівозміні. Такий передпопередник цукрових буряків як ячмінь викликав найбільшу забур'яненість культури: 79,8 і 115,2 шт./м² відповідно у сівозмінах з 30 і 40 % буряків. У ланці з ячменем проти ланки із чорним паром забур'яненість посівів цукрових буряків зросла на 55,6 % у сівозміні з 30 % буряків і на 91,4 % у сівозміні з 40 % буряків (рис. 1).

Висновки. 1. Чорний пар сприяє очищенню полів від бур'янів і зменшує їхню кількість у посівах цукрових буряків.

2. Цукрові буряки в сівозмінах слід розміщувати в ланках із чорним паром і багаторічними травами однорічного використання.

3. При введенні в 10-пільну сівозміну третього й четвертого полів цукрових буряків та при скороченні періоду повернення їх на попереднє поле істотно підвищується забур'яненість посівів.

4. У зоні недостатнього зволоження південно-східної частини Лівобережного Лісостепу України оптимальним рівнем є 20 % насичення зерно-бурякових сівозмін цукровими буряками, що в кінцевому підсумку дасть можливість одержувати високу продуктивність цукрових буряків.

Бібліографія

- Бондарчук А.А. Небезпечні конкуренти// Цукрові буряки. – 1999, № 1. – С. 14-15.
- Іващенко О.О., Макух Я.П., Щеринський В.О. Цукрові буряки без „зеленої пожежі” // Цукрові буряки. – 1999, № 2. – С. 12-13.
- Потьомкін В.О. Ефективність дії гербіцидів і їх композицій на берізку польову// Цукрові буряки. – 2003, № 3 (33). – С. 15.
- Слободянік В.К., Савчук К.А., Серба Ю.Г. Шкодочинність бур'янів на посівах цукрових буряків. Особливості забур'янення посівів і захист від бур'янів у сучасних умовах (Матеріали конференції). – Київ „Світ”, 2000. – С. 35-39.

Анотація

У статті показано вплив сівозмін із різним насиченням цукровими буряками на забур'яненість посівів цукрових буряків. Розглянуто забур'яненість посівів цукрових буряків у сівозмінах із двома, трьома й чотирма полями цукрових буряків.

Annotation

In article shows the influence of rotations with different percentage of sugar beet on weed infestation of sugar beet stands in rotations with two, tree and four fields of sugar beet.

Annotation

The article shows the influence of rotations with different percentage of sugar beet on weed infestation of sugar beet stands in rotations with two, tree and four fields of sugar beet.