

## **ВИКОРИСТАННЯ ЯРИХ СОРТІВ У СЕЛЕКЦІЇ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ**

---

В.В. Шелепов<sup>1</sup>, Л.М. Голик<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Державна наукова сільськогосподарська бібліотека УААН,

<sup>2</sup>Миронівський інститут пшениці ім. В.М. Ремесла УААН

Наведені результати довгострокової дії низьких температур (термічний мутагенез) на насіння сортів ярої м'якої пшениці різного еколо-географічного походження для одержання нового, зимостійкого вихідного матеріалу. За допомогою дії низьких температур на сорти ярої м'якої пшениці, створено сорти озимої пшениці Миронівська ранньостигла, Ремеслівна, Волошкова, які в різні роки занесені до Державного реєстру сортів рослин України, та передані на ДСВ сорти Багіра, Вдячна, Святкова.

*Пшениця яра, пшениця озима, вихідний матеріал, сорти, низькі температури, термічний мутагенез*

На сучасному етапі селекції по вивченю озимої пшениці все частіше бракує нового вихідного матеріалу. Такі роки, як 1997, 2003 дають нам зрозуміти, що в селекційному процесі крім посухостійких, потрібні й зимостійкі сорти, які б витримували стресові фактори, були донорами стійкості до важливих хвороб, мали високу якість зерна. Проблема зростає ще й тому, що ці важливі ознаки повинні вирішуватися з постійним підвищеннем урожайності.

Мутаційний процес в еволюції органічного світу можна розглядати як шлях пошукув нового вихідного матеріалу та виявлення неоднакової його реакції у відповідь на зміну середовища. У кожного виду збільшення генного різноманіття продовжується безперервно, хоча і дуже повільно [1, 2].

Дія низької температури (термічний мутагенез) на проростки хлібних злаків частково прискорює цей процес, і у рослин виникають спадкові зміни важливих ознак і властивостей. Низькі температури на сортозразки ярої м'якої пшениці викликають появу форм зі зміненою

морозостійкістю, зимостійкістю і скоростиглістю, а також зміненими морфологічними ознаками.

З умовою збагачення і розширення вихідного матеріалу при створенні озимих сортів пшениці все частіше використовують сорти ярої м'якої пшениці.

Не викликає сумніву положення, що стабільність, тобто реалізація генетично детермінованої програми онтогенезу, імперативом якої є збереження виду та залишення нащадків, знаходиться під генетичним контролем. Виживання організмів, зокрема рослинних, у гетерогенному навколошньому середовищі обумовлюється певною пластичністю їх організації у відповідь на зміни екологічних факторів, яка має пристосувальний характер і спрямована проти порушень росту і розвитку, генетичних або спричинених зовнішнім середовищем [3].

Таке припущення базується на концепції еволюції онтогенезу Шмальгаузена [4], основу якої складають уявлення про підвищення стійкості процесів індивідуального розвитку в еволюції та домінантності норми, що гарантує стабільність нормального формоутворення за наявності мутацій, існування складної взаємодії процесів стабілізації та еволюції онтогенезу, які відбуваються на фоні його мінливості. Він писав: „Ми дійшли висновку, здавалось, до парадоксального, що механізми індивідуального розвитку забезпечують увищих тварин через систему кореляцій певну стійкість організації, а апарат спадковості (з його мутаціями), тобто структура генома, гарантує достатню її пластичність в процесі еволюції” [4, с. 365].

Здатність генотипу варіювати експресією та реалізуватися у різних фенотипах у відповідь на різноманітні зовнішні впливи є фундаментальною властивістю організмів, що відома як фенотипна пластичність, завдяки чому організми можуть пристосовуватися до часових та просторових варіацій навколошнього середовища [3].

Суперечки щодо використання методу В.М. Ремесла і його послідовників „направленої зміни ярих форм пшеници в озиму [5]”, „трансформації ярих сортів в озимі [6]”, „термічного мутагенезу [7]” існували і існують. Однак, на нашу думку, цю проблему добре вирішують у Луганському інституті АПВ УААН, де шляхом трансформації в озиму форму мексиканського ярого зразка ВІР **k-347015** створено сорт озимого тритикале **Благодатний** (занесений на 2005 р. в Реєстр сортів рослин України) [8]. На 2007 р. створено і занесено до Державного реєстру сорт пшеници озимої **Зимоярка**, отриманого з німецького ярого сорту під впливом осінньої сівби в Інституті ФРіГ НАН України [9]. У Сибірському НДІ рослинництва і селекції СВ РАСГН отримана велика колекція спонтанних ярих мутантів пшеници, жита та тритикале шляхом сівби

озимих культур весною [10]. У Каменному Степу (ГНУ НДІСГ ЦЧП імені В.В. Докучаєва РАСГН) „использовали такие методы, как направленное изменение яровых пшениц в озимые, мутагенез. Для направленного изменения яровых пшениц в озимые привлекали сорта яровой пшеницы **Артемовка, Саррубра, Саратовская 29, Альбидум 210** и др. Использование указанных методов дало результат в виде создания **регионального генофонда сортов озимой пшеницы** с новым морфотипом, отличающимся от Степной 135 и Червонной” [11 с. 448].

Враховуючи всі ці проблеми, метою наших досліджень є створення вихідного матеріалу і сортів озимої м'якої пшениці з використанням ярої м'якої пшениці за допомогою термічного мутагенезу (термічний мутаген – низькі температури).

Метод В.М. Ремесла [12] складається з двох етапів. Перший – підготовчий: довгострокова (90-120 днів) яровизація насіння ярих сортів, що тільки-но наклюнулось, за температури 0°C, посів весною і вирощування в весняно-літній період. На другому етапі одержане в результаті насіння висівають восени в оптимальні для зони строки посіву озимої пшениці.

Нами зроблено уточнення цього методу шляхом заміни марлевих торбинок алюмінієвими бюксами з отворами 0,5-0,7 см. На дно бюкса вкладали дерев'яні палички, покривали їх фільтрувальним папером. Об'єктом вивчення було насіння м'якої ярої пшениці, відібраної з колекційного розсадника (159 зразків). Насіння (80-100 зерен) засипали в бюкси і намочували водою, для накльовування залишали при температурі 18-20°C. Через два дні насіння, що тільки-но наклюнулось, ставили на яровизацію в холодильну камеру з коливанням температури від 0 до мінус 2°C. В термостаті було вмонтовано вентилятор для розгону холодного повітря по всій камері. Після яровизації насіння весною висажували в полі для порівняння з не яровизованим.

Насіння сортозразків M<sub>2</sub>, зібране з рослин, які вросли після передньої яровизації зерна і весняного посіву, оцінювали в лабораторії на продуктивність колоса, вирівняність та склоподібність, після чого перед посівом ділили на 3 частини. Три частини насіння M<sub>2</sub> в (2004-2006 рр.) висівали в різні строки сівби: на початку оптимальних строків сівби (10-13 вересня), в кінці оптимальних (22-25 вересня) та 10-15 жовтня селекційною сівалкою СН-10Ц з розрахунком 250 зерен на 1 m<sup>2</sup> 3-х рядковими ділянками (3 рядки × 1,2 м довжина × 0,275 м ширина міжрядь). Ділянки розміщували по типу селекційного розсадника. Зимостійкість селекційного матеріалу визначали підрахунком кількості рослин восеною згідно з методикою Державного сортовипробування сільськогосподарських культур [13].

Стан рослин  $M_2$  перед припиненням осінньої вегетації і входом у зиму на ділянках одного й того самого сортозразка був різним. На ділянках першого строку сівби посіви були зрідженими, але рослини виглядали більш крупнішими, добре розкущеними – мали 4-5 стебел і переросли. Рослини другого строку сівби були в доброму стані, розкущені (3-4 стебла). Останнього строку посіву були у фазі 2-3 листочків, а іноді – у фазі шильтця. Все це зумовлювало різний ступінь перезимівлі рослин. Незалежно від сорту, сортозразки першого строку посіву мали меншу кількість рослин, які перезимували, в порівнянні з ділянками рослин другого і пізнього строків сівби. Так, середній відсоток рослин, які перезимували, за першого строку сівби коливався в межах 36,1-53,3%, другого – 65,8-68,4% і пізнього – 68,1-72,8%. Вплив еколого-географічного походження сортозразків відмічено тільки при ранньому строку посіву, де афро-азійські сортозразки перезимовували майже на 20% (36,1) нижче в порівнянні з європейськими і американськими (53,3-56,3%).

Дослідження показали, що за дії низьких температур у залежності від еколого-географічного походження ярих сортів (78 – європейського походження, 51 – американського та 30 – африкансько-азійського), в другому поколінні при ранньому строку сівби в 2004-2006 рр. мали різну кількість зимостійких форм. Причому в залежності від еколого-географічного походження і генотипу ярих сортів, становлення озимості проходить по-різному (табл. 1).

Дані таблиці 1 свідчать, що на перезимівлю рослин  $M_2$  суттєво впливали умови перезимівлі: у суворі зими загибель рослин була значно більшою, особливо на ранніх строках сівби. В сприятливі за умови перезимівлі роки гинуло менше рослин. На перезимівлю рослин також впливали й умови осені: в роки з великою кількістю ясних сонячних днів у рослин краще проходило загартування, підвищувалася стійкість до несприятливих температур. У роки з більш похмурами днями перезимувало значно менше рослин – 30-50%, і ще менше – в суворі зими. В європейських і американських сортозразках більшість (відповідно: 55,1 і 68%) перезимували на 50 і більше відсотків, в зразках афро-азійського походження 50% перезимували слабо – до 30%.

Сорти американського і афро-азійського походження характеризуються низькою нормою реакції на зимові екстремальні фактори. У другому поколінні, коли рослини цих сортів попадають в умови зовнішнього середовища, не суттєві для умов ярої пшениці, при яких забезпечується виживання їх за рахунок модифікаційної зміни і індивідуальної буферності, вирішальну роль починає відігравати генотипова зміна, що забезпечує появу нових норм реакції, тобто нових генотипів. Тому у даних сортів в третьому поколінні практично закінчується формування озимості.

Таблиця 1.

Вплив генотипу на перезимівлю  
(сівба на початку оптимальних строків 10-13 вересня)

Пере- зи- мівля, %	Походження					
	європейське		американське		афро-азійське	
	Кіль- кість зразків, шт.	%	Кіль- кість зразків, шт.	%	Кіль- кість зразків, шт.	%
<b>2004 р.</b>						
0-10	18	23,1±3,5	4	7,8±5,1	10	33,3±4,1
11-30	4	5,1±4,2	-	-	9	30,0±3,8
31-50	32	41,0±5,7	7	13,7±4,9	7	23,3±5,1
51-70	24	30,8±4,1	22	43,1±5,7	4	13,4±4,7
71-100	-	-	18	35,4±5,4	-	-
<b>2005 р.</b>						
0-10	2	2,6±3,0	4	7,8±5,0	4	13,4±4,0
11-30	3	3,8±3,5	7	13,7±5,1	10	33,3±3,8
31-50	14	17,9±4,3	21	41,2±6,0	7	23,3±4,1
51-70	19	24,4±4,1	3	5,9±5,7	2	6,7±4,0
71-100	40	51,3±5,7	16	31,4±6,3	7	23,3±5,3
<b>2006 р.</b>						
0-10	10	12,8±4,0	1	2,0±0,0	10	33,3±4,0
11-30	20	25,6±4,2	2	3,9±3,0	2	6,7±3,0
31-50	2	2,6±3,8	5	9,8±4,0	1	3,3±0,0
51-70	8	10,3±4,6	26	51,0±5,7	6	20,0±5,6
71-100	38	48,7±4,9	17	33,3±5,0	11	36,7±4,6
<b>Середнє</b>						
0-10	10	12,8±4,2	3	5,9±5,2	8	26,7±4,7
11-30	9	11,6±5,7	3	5,9±5,1	7	23,3±4,8
31-50	16	20,5±4,9	11	21,6±4,2	5	16,7±5,1
51-70	17	21,8±5,6	17	33,3±4,8	4	13,3±3,7
71-100	26	33,3±4,3	17	33,3±4,9	6	20,0±4,1

Для сортів європейського походження характерна більш широка норма реакції до екстремальних факторів зовнішнього середовища. В другому поколінні виживання рослин цих сортів забезпечується завдяки модифікаційній зміні та індивідуальній буферності, що знижує генотипову зміну. Формування озимості закінчується в третьому-четвертому поколіннях.

Серед сортозразків, які за два роки (2005-2006) мали кращу пере-

зимівлю рослин, заслуговують уваги: **європейські** – Миронівська яра, Харківська 18, Колективна 3, Харківська 6 (Україна); Славянка Сибірі, Омська 31, Фора, Саратовська 62 (Росія); KADET, WW 253500, SONETT (Швеція); Hja 22139, JO 8275 (Фінляндія); Achill (Бельгія); Filou (Франція); Leguan (Чехія); TAIFUN, ATTIS, QUATTRRO, Nandu (Німеччина); BESSO (Швейцарія); **американські** – Selkirk (Канада); ND 605 (США); CM 95560, MRL/BUC//VEE # 7 (Мексика); **африкансько-азійські** – AUT – RF 200-49, AUT – IRR – 99-54, AUT – RF – 99-64 (Сирія); Norin 35 (Японія); Складний гібрид (Лівія).

Серед сортів, занесених до Державного реєстру сортів рослин України за 2002-2008 рр., найбільшого поширення набули Миронівська ранньостигла і Ремеслівна; Волошкова тільки починає впроваджуватися у виробництво.

**Миронівська ранньостигла** (ВТ-2288, Туніс), різновидність лютесценс, напівкарликового типу. Зимостійкість висока, ранньостиглий – дозріває на 1-2 дні раніше Донської напівкарликової. Стійкий до грибкових хвороб і вилягання. Продуктивність 6,0-6,5 т/га. За якістю зерна – цінна пшениця. Занесений до Реєстру в 2002 р.

**Ремеслівна** (KVZ/CUT-75, Мексика), різновидність лютесценс, напівкарликового типу. Зимостійкість висока. Стійкий до грибкових хвороб, вилягання і осипання. Урожайність – 6,0-6,5 т/га. За якістю зерна – сильна пшениця. Занесений до Реєстру в 2003 р.

**Волошкова** (FLAMBORD, Франція), різновидність лютесценс, середньорослий. Зимостійкість висока, середньостиглий. Стійкий до грибкових хвороб і осипання. Урожайність – 6,4-9,8 т/га. Занесений до Реєстру в 2008 р.

Сорти зі зміненим типом розвитку: Багіра, Вдячна та Святкова вивчаються в державному сортовипробуванні. **Багіра** (SUNNAN, Швеція), різновидність лютесценс, середньорослий. Зимостійкість висока, середньостиглий. Стійкий до грибкових хвороб і осипання. Урожайність – 5,9-9,76 т/га. Переданий на ДСВ в 2004 р. **Вдячна** (ВТ-2288, Туніс), різновидність еритроспермум, напівкарликового типу. Стійкий до посухи, ультра ранньостиглий. Середньостійкий до грибкових хвороб. Максимальна урожайність – 7,46 т/га. За якістю зерна – сильна пшениця. Переданий на ДСВ у 2005 р. **Святкова** (BAW «S» 7, Мексика), різновидність лютесценс, середньорослий. Високо зимостійкий, середньостиглий до грибкових хвороб. Середня урожайність в конкурсному сортовипробуванні МП (2004- 2005 рр.) 7,34 т/га. Переданий на ДСВ в 2006 р.

Створений озимий вихідний матеріал із ярих сортів Мексики, Індії і США широко використовуємо в гібридизації, що дозволяє підви-

щити хлібопекарські якості, стійкість до хвороб та інші властивості. Так в сортах **Колос Миронівщини** (занесений до Реєстру в 2008 р.), використано змінений ярий сорт SHAMSCI (Індія), **Пам'яті Ремесла**, переданий на ДСВ (2006 р.) – ВТ-2288 (Туніс).

У селекційному розсаднику щорічно вивчаємо 1400-1600 сімей з яких добираємо добори константних форм в кількості 400-500 сімей для формування контрольного розсадника.

У конкурсному сортовипробуванні за останні три роки (2005-2007) вивчалося 74 лінії озимої пшеници, створених за допомогою термічного мутагенезу. Серед них заслуговують уваги лінії: Лютесценс 33147, Лютесценс 28630, Лютесценс 31069, Лютесценс 33018. Найбільш урожайною є Лютесценс 33147 – 6,62-8,23 т/га, яка може в 2008 р. бути претендентом на державне сортовипробування.

**Висновки.** Використання в селекції термічного мутагенезу (довгострокова дія понижених температур на насіння ярої пшеници шляхом яровизації та сівби в наступних поколіннях восени на початку оптимальних для даної зони строків) дає можливість створювати оригінальний, зимостійкий, з більш багатою генетичною основою вихідний матеріал. Підтвердженням цьому є створення сортів Миронівська ранньостигла, Ремеслівна, Волошкова, Багіра, Вдячна, Святкова.

У перспективі хотілося б, щоб селекціонери, генетики, фізіологи з інших селекційних інститутів, які зацікавлені в цьому питанні, відгукнулися до співпраці. Матеріал M<sub>2</sub>-M<sub>4</sub>, який накопичений в МІП ім. В.М. Ремесла, можна висіяти в іншій місцевості, в інших умовах вирощування, проаналізувати його для порівняння результатів та їх обговорення.

#### Бібліографічний список

1. Сапегин А.А. Филогенетические исследования пшеницы мягкого рода // Тр. прикладной ботаники, генетики и селекции. – 1928. – Т. 19.
2. Сапегин А.А. Рентгеномутации как источник новых сортов сельскохозяйственных растений // Природа. – 1934. - № 9. – С. 28-32.
3. Кордюм Е.Л. Стабильность и пластичность онтогенезу рослин // Физиология и биохимия культ. растений – К.: 2003. – Т.35. – № 6. – С. 528 – 534.
4. Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1940. – 231 с.
5. Ремесло В.Н. Методы создания высокопродуктивных сортов озимой пшеницы // Проблемы и методы повышения урожайности сельскохозяйственных культур. – Сб. науч. тр. МІП им. В.Н. Ремесло. – 1978. – Вып. 3. – С. 3-6.

6. Шебитченко В.Ю., Булавка Н.В., Колючий В.Т., Лаврушкина Г.С. К проблеме цитогенетического механизма превращения яровых форм пшеницы в озимые // Проблемы и методы повышения урожайности сельскохозяйственных культур. – Сб. науч. тр. МИП им. В.Н. Ремесло. – 1978. – Вып. 3. – С. 22-23.
7. Шелепов В.В., Коломиець Л.А. Термический мутагенез, как фактор создания высокозимостойких сортов пшеницы // Селекция, семеноводство и возделывание полевых культур / Матер. межд. науч.-практ. конф. «Проблемы аграрного производства южного региона России (ландшафтная система земледелия, плодородие почв, селекция и семеноводство)», посвящённой столетнему юбилею Северо-Донецкой сельскохозяйственной опытной станции (1904-2004). – Ростов-на Дону, 2004. – С. 339-343
8. Шевченко А.М., Шевченко Н.А. Высокоадаптивные отличные по качеству продукции сорта озимых культур // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. – К.: Логос, 2007. – Т. 2. - С. 204 – 208.
9. Державний Реєстр сортів рослин придатних для поширення в Україні / За ред. Волкодава В.В. – К., 2007. – 232 с.
10. Стёпочкин П.И., Артёмова Г.В. Создание и изучение коллекции спонтанных яровых мутантов пшеницы, ржи и тритикале в СИБНИИРС // Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке. Состояние, проблемы перспективы / Тез. докл. II Вавиловской межд. конф. 26-30 сентября 2007 г. – СПб, 2007. – С. 350 – 352.
11. Дорохов Б.А. Селекционно-генетические ресурсы озимой пшеницы Каменной Степи // Генетические ресурсы культурных растений в XXI веке. Состояние, проблемы перспективы / Тез. докл. II Вавиловской межд. конф. 26-30 сентября 2007 г. – СПб, 2007. – С. 448 – 450.
12. Ремесло В.Н., Шебитченко В.Ю., Ремесло В.В. Способ получения исходного материала для селекции озимых злаков // А.с. № 897176. – М., 1982.
13. Методика державного сортовипробування сільськогосподарських культур / Під ред. В.В. Волкодава – К., 2000. – Вип. 1. – 100 с.

Приведены результаты долгосрочного действия низких температур (термический мутагенез) на семена сортов яровой мягкой пшеницы разного эколого-географического происхождения для получения нового, зимостойкого исходного материала. Под действием низких температур на сорта яровой мягкой пшеницы созданы сорта озимой пшеницы Мироновская раннеспелая, Ремесливна, Волошкова, которые в разные годы занесены в Государственный реестр сортов растений Украины, и переданы на ГСИ Багира, Вдячна, Святкова.

The results of long-term influence of low-temperatures (thermal-mutagenesis) on seeds of spring bread wheat varieties of diverse eco-geographical origin for obtaining a new winter-hardy initial material are given. Under the low temperature influence on the varieties of spring bread wheat the cultivars of winter wheat – Mironovskaya rannespelaya, Remeslivna, Voloshkova have been developed and they entered the State Variety List in different years and were sent to SVT, they were Bagyra, Vdyachna, Svyatkova.